

2022年 6月 相談 一 覧

(令和4年6月1日～6月30日)

	令和4年度の 件数	総合件数	相 談 日	相談時間	担当者	相 談 内 容	契機	事前訪問・同行	在宅歯科診療	患者名
	6	553	2022/4/22	15:13～15:18	徳本	<p>◇総合病院より自宅退院の患者様の連携依頼。2022/2/2転倒による左大腿骨頸部骨折のため入院。2/17から口腔ケアおよび嚥下チーム介入。VFの結果咽頭残留ありミキサー食まで下げていたが徐々に改善し3/3口腔ケアチーム介入終了。4月にはベッド上座位にて食事可能となり米飯、一口大まで摂取可能。退院後のフォローをかかりつけ歯科に依頼したい</p> <p>歯科衛生士：CMとキーパーソン(次女)に相談したところ、現在奥様は施設に入所されており退院後は次女と同居になるとのこと。以前は外来受診していたが今回の退院後は通院困難。訪問診療、訪問看護も介入予定。口腔についての現状を説明し訪問歯科を希望であればかかりつけ歯科医師に連携室より訪問診療の相談することも可能だと伝えた。退院後、本人と相談し結果を連絡してもらうこととなった。</p> <p>→5/25次女より連絡があり5/11に自宅退院し落ち着いてきたので訪問歯科をお願いしたいとの事。かかりつけ歯科医師に訪問を依頼し、家族とCMに報告。日程調整は家族とかかりつけ歯科医師で直接行って頂く。</p> <p>→6/6かかりつけ歯科医師より連絡。訪問し義歯新製のための印象を採った後ご家族から連絡があり誤嚥性肺炎のため再入院になったとのこと。入院先の総合病院にも連絡を入れ再度退院する時は連絡を頂く。</p>	SW	なし	訪問歯科	戸畑区 97歳 男性
1	14	561	2022/6/8	11:10～11:15	徳本	<p>◇入退院時連携で総合病院より入院連絡。</p> <p>歯科衛生士：かかりつけ歯科医院に連絡し報告書作成を依頼。依頼元に報告書を送付した。</p>	歯科医師	なし	入退院時連携	86歳 女性
						◇入退院時連携で総合病院より別の総合病院から口蓋癌の放射線化学療法のため転院された患者様の入院連絡。				

2	15	562	2022/6/10	14:00~14:05	徳本	<p>歯科衛生士：かかりつけ歯科と転院前の総合病院の歯科医師に報告したところかかりつけ歯科医院へは外来通院していたようですが近年は施設に入所されていたようで施設の関連病院の歯科医師が訪問診療を行っていたようです。かかりつけ歯科医師は患者様が希望すれば訪問診療は可能との事なので退院が決まり次第ご連絡をいただき退院後の調整を行う。</p>	歯科医師	なし	入退院時連携	86歳 男性
3	16	563	2022/6/13	13:00~13:05	徳本	<p>◇入退院時連携で総合病院より入院連絡。 歯科衛生士：かかりつけ歯科医院に連絡し報告書作成を依頼したが直接、返答したとのこと。</p>	歯科医師	なし	入退院時連携	80歳 男性
4	17	564	2022/6/16	12:22~12:25	徳本	<p>◇総合病院より自宅退院の患者様の連携依頼。食道Caに対するESD目的で入院加療中。5/27に手術施行され、口腔外科で周術期口腔管理を実施。本日退院となったため訪問歯科診療の再開依頼。 歯科衛生士：かかりつけ歯科医院に連絡し訪問診療の再開を依頼</p>	歯科医師	なし	入退院時連携 (訪問歯科)	77歳 戸畑区 小芝 男性
5	18	565	2022/6/22	10:41~10:45	徳本	<p>◇総合病院より施設退院の患者様の連携依頼。誤嚥性肺炎、尿路感染症で入院加療中。VF結果より不顕性誤嚥の疑いあり。経口摂取のみではカロリー不足であるため6/4より経管栄養を再開。15時にお楽しみ程度の経口摂取を行っている。今後の栄養状態の改善によっては経口摂取再開も期待できること不顕性誤嚥があることから口腔ケア、嚥下訓練が必要であるため退院後の連携依頼。 歯科衛生士：退院先施設に連絡、経緯を説明。定期的に訪問歯科診療に来ている歯科医院はあるが担当看護師が不在であるため協議し、後日担当看護師より連絡を頂けるとのこと。6/28退院直後より発熱があり誤嚥性肺炎の再発で再入院となった。依頼元歯科医師に報告し再度退院が決まったら連絡頂く</p>	SW	なし	再入院	87歳 戸畑区 観音寺町 男性
						◇入退院時連携で総合病院より退院連絡。				

6	19	566	2022/6/23	15:51~15:55	徳本	歯科衛生士：かかりつけ歯科医院に連絡し退院を報告し、診療情報提供書をFAXした。	歯科医師	なし	入退院時連携 (外来受診)	13歳 女性
7	20	567	2022/6/23	16:55~17:00	長江	<p>◇研修会に参加されたCMより相談。 施設で2リットルの飲料水にとろみをつける方法についての相談があった。定量のとろみ剤入れてボトルを振って出来るか否かの質問もあった。</p> <p>管理栄養士：メーカー（株式会社クリニコ、株式会社明治）に確認の上、6月27日、電話にて回答。 基本的には、ボールに2リットル飲料水を入れ、定量のとろみ剤を加え泡だて器でしっかりとろみがつくまで30秒混ぜる。ボトルで振ってもトロミはつくがダメになったり、ボトルにとろみ剤が付着して綺麗にとろみがつかない可能性があることを伝えた。</p>	CM	なし	なし	なし